

Leia atentamente este folheto porque ele contém informações importantes para si.
Este medicamento está disponível sem prescrição médica. No entanto, precisa de utilizar BETADINE Solução para Gargarejar cuidadosamente para obter os melhores resultados.
Guarde este folheto. Pode necessitar de o ler novamente.
Se necessitar de mais informações ou conselhos, pergunte ao seu farmacêutico.
Deve consultar um médico se os sintomas se agravarem ou não melhorarem após 5 dias.

Neste folheto:

1. O que é e para que serve BETADINE Solução para Gargarejar
2. Antes de utilizar BETADINE Solução para Gargarejar
3. Como utilizar BETADINE Solução para Gargarejar
4. Possíveis efeitos secundários.
5. Conservação de BETADINE Solução para Gargarejar

BETADINE Solução para Gargarejar

100mg/ml

Iodopovidona

A substância activa é a Iodopovidona 10g/100ml (correspondente a 1g de iodo activo)
1 ml de solução contém 0,01 g de iodo activo

Os outros componentes são: mentol, glicerol, sacarina sódica, hidróxido de sódio e água purificada.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Viatris Farmacêutica, S.A.

Rua do Centro Cultural, nº 13 - 1749-066 Lisboa

1. O QUE É E PARA QUE SERVE BETADINE SOLUÇÃO PARA GARGAREJAR

Classificação Farmacoterapêutica: 6.1.1 Medicamentos que actuam na boca e orofaringe: de aplicação tópica.

Trata-se de um anti séptico na forma de solução bucal de cor castanha.

Embalagens de 125ml

Indicações terapêuticas:

A BETADINE Solução para Gargarejar é um medicamento usado como desinfectante da cavidade oral, boca e faringe e ainda para eliminar o mau hálito.

2. ANTES DE USAR BETADINE SOLUÇÃO PARA GARGAREJAR

Quando não pode utilizar BETADINE Solução para Gargarejar

Se é alérgico à substância activa ou a qualquer dos outros ingredientes.

Se estiver grávida

Crianças com menos de 6 anos de idade

Não utilizar no caso de doenças da tiróide nem antes ou após radioterapia.

Ao mesmo tempo que outros produtos como sabões, soluções ou pomadas que contenham na sua composição sais mercuriais.

Situações em que deve ter cuidado com BETADINE Solução para Gargarejar

Se tem alguma doença na tiróide não deve utilizar este produto durante um período de tempo longo.

Esta apresentação de BETADINE destina-se apenas a ser usada na cavidade bucal. Não deve ser utilizada noutras zonas do corpo. No entanto, existem outras apresentações da gama BETADINE que poderão ser aplicadas em várias outras zonas do corpo, dependendo da situação a tratar.

Gravidez

Não utilize este medicamento se estiver grávida.

Aleitamento

Se está a amamentar, pode utilizar este medicamento desde que não seja uma utilização prolongada.

Condução de veículos e utilização de máquinas:

Não relevante

Uso de outros medicamentos

Por favor informe o seu médico ou farmacêutico se está a utilizar ou se utilizou recentemente outros medicamentos mesmo se forem medicamentos não sujeitos a receita médica.

3. COMO UTILIZAR BETADINE SOLUÇÃO PARA GARGAREJAR

Utilize sempre a BETADINE Solução para Gargarejar, como está indicado. Se tiver dúvidas pergunte ao seu farmacêutico.

BETADINE Solução para Gargarejar deve usar-se pura em gargarejos ou bochechos durante 30 segundos várias vezes ao dia.

Quando é usada para tratar o mau hálito, deve diluir-se em água, misturando 1 parte de BETADINE para 2 partes de água.

BETADINE Solução para Gargarejar não deve ser deglutida.

Não utilizar este medicamento por um período superior a 14 dias consecutivos.

Como proceder no caso de sobredosagem

Uma vez que a BETADINE Solução para Gargarejar se destina a aplicação tópica não estão descritos casos de sobredosagem. No entanto, se ingerir acidentalmente uma quantidade maciça do produto dirija-se imediatamente a um hospital.

Como proceder se se esquecer de utilizar BETADINE Solução para Gargarejar

Pode continuar normalmente a utilizar o medicamento como se não se tivesse esquecido.

APROVADO EM 25-05-2006 INFARMED

4. POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS

Tal como qualquer medicamento, BETADINE Solução para Gargarejar pode ter efeitos secundários.

Podem ocorrer embora raramente reacções alérgicas.

No caso de absorção sistémica podem surgir alterações da função renal, acidose metabólica, hipernatrémia (aumento do sódio no sangue).

Se notar algum efeito adverso não descrito neste folheto, deve comunicar ao seu médico ou farmacêutico.

5. CONSERVAÇÃO DE BETADINE SOLUÇÃO PARA GARGAREJAR

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Conservar à temperatura ambiente.

Não utilizar depois da data de validade referida na embalagem.

Data da última aprovação deste folheto: Maio 2006

VIATRIS

VIATRIS - FARMACÊUTICA, S.A.

Rua do Centro Cultural, nº 13 - 1749-066 Lisboa